

新疆哈萨克熏马肠煮制过程中汤汁中游离氨基酸和挥发性物质分析

刘文营¹ 李开雄² 王守伟^{1*} 李 享¹ 成晓瑜¹ 乔晓玲¹

(¹ 中国肉类食品综合研究中心 国家肉类加工工程技术研究中心 北京食品科学研究院 北京 100068

² 石河子大学食品学院 新疆石河子 832003)

摘要 熏马肠是我国哈萨克族居民加工的一种传统肉制品,煮制成熟的熏马肠和汤汁都深受人们的喜爱,为了量化熏马肠煮制过程中滋味和挥发性风味物质的释放,对不同煮制时间汤汁中的游离氨基酸、主体风味特征、味觉特性和挥发性风味物质组分进行分析。结果显示,汤汁中的游离氨基酸总量呈增加趋势,煮制 105 min 和 120 min 时游离氨基酸总量显著高于煮制初期 ($P < 0.05$),而不同煮制时间的呈鲜、呈甜和呈苦味氨基酸百分比差异不显著 ($P > 0.05$)。汤汁咸味值、鲜味值、丰富度、苦味值、苦味回味值均随时间的延长呈增加趋势,涩味值和涩味回味值的变化规律不明显。不同煮制时间汤汁的挥发性成分具有明显差异,挥发性物质总量呈先增加后降低的趋势。汤汁主体风味成分在 PC1 和 PC2 上的方差贡献率为 97.06%,风味特征明显,且在 LD1 和 LD2 上的方差贡献率为 85.27%,通过风味主体成分可以区分不同的样品。煮制 105 min 时游离氨基酸含量较高,主体风味得到一定保持,涩味值未显著升高,较适宜用作熏马肠的熟制。

关键词 熏马肠; 游离氨基酸; 主体风味; 挥发性风味物质; 味觉特征

文章编号 1009-7848(2020)04-0270-11 doi: 10.16429/j.1009-7848.2020.04.034

熏马肠是哈萨克族居民每年于入冬时节加工的传统马肉制品,是哈萨克族集中居住地区特殊环境和饮食文化的重要载体^[1]。随着“一带一路”倡议的实施和发展,新疆独特的区位优势 and 向西开放的重要窗口作用^[2],使得熏马肠等特色民族食品被越来越多的消费者所接触。相应地,熏马肠等食品加工产业的发展,也必然有助于促进地区经济发展,对人们生活水平提高和社会稳定均有裨益^[3-4]。

目前,研究者针对熏马肠的研究集中于开展降盐加工工艺^[5],生物胺分析^[6],以及与生物胺生成有关的微生物菌相^[7-8]和调控研究^[9]等。加工工艺会对熏马肠脂肪氧化^[10]、脂肪酶活力^[11]和挥发性风味

物质^[12]产生影响,而颜色^[13-14]、滋味^[14]和风味^[14-17]等感官特征都是肉制品品质的重要参考,研究者也试图通过多种方法来改善肉制品的感官品质^[18-19]。然而,目前除少数研究对熏马肠挥发性风味物质分析外^[12],鲜有文献对熏马肠煮制成熟过程中主体风味、味觉特性和挥发性风味物质释放等感官品质进行分析,而肉制品的感官特性又是影响消费者消费体验和购买意愿的决定性因素^[20]。鉴于此,本文选取哈萨克族居民以传统方法制备的熏马肠作为研究对象,对其煮制过程中汤汁滋味和风味物质释放进行分析。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

熏马肠,于 2018 年 12 月采集于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市。熏马肠的加工工艺:新鲜马肉经去骨和筋膜后,加入食盐(质量分数 2.5%)、白砂糖(质量分数 2.0%)和香辛料(质量分数 0.5%,胡椒粉、八角粉、花椒粉、姜)后腌制 24 h,切为小块(2 cm×2 cm×2 cm)后灌装,置于

收稿日期: 2019-07-14

基金项目: 国家重点研发计划专项(2016YFD0401503);
农业农村部典型农产品品质指标体系构建与
指标筛选验证项目(GJFP2019043);北京市自然
科学基金项目(6192009)

作者简介: 刘文营(1983—),男,硕士,高级工程师

通讯作者: 王守伟 E-mail: cmrcsw@126.com

50~70 °C 烘房内烟熏 12 h。

氯化钾(KCl)、酒石酸、氯化银(AgCl)、乙醇、氢氧化钾(KOH)、氢氧化钠(NaOH)、盐酸(HCl)、柠檬酸钠($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), 国药集团化学试剂有限公司; 2-甲基-3-庚酮(99.9%, CAS 号 13019-20-0), 美国 Sigma Aldrich 公司; 电极内部液、清洗液, 日本 insent 公司; 氮气(99.9%), 北京如源如泉科技有限公司; 茚三酮显色液(货号: 299-70501), 日本和光纯药工业株式会社(Wako)。

1.2 仪器与设备

Cascade BIO 纯水机, 美国 PALL 公司; 0.22 μm 微滤膜, 美国 PALL 公司; BSA822-CW 天平, 赛多利斯科学仪器有限公司; F6/10-10G 超细匀浆器, 上海 FLUKO 流体机械制造有限公司; PEN3 电子鼻, 德国 Airsense 公司; TS5000Z 味觉分析系统, 日本 INSENT 公司; L-8900 高速全自动氨基酸分析仪, 日本日立公司; GC-MS 联用仪(TG-Wax MS 极性柱, 30 m \times 0.25 mm, 0.25 μm), 美国赛默飞世尔科技(中国)有限公司; Gerstel TDS 半自动热脱附进样器, 德国 Gerstel 公司。

1.3 试验方法

1.3.1 熏马肠蒸煮熟制 熏马肠经温水清洗后均分为 3 组, 每组 1.0 kg, 均切为 1 cm 长小段, 按照 1:3 的质量比加入纯水, 置于电磁炉上保持微沸加热, 分别于水沸腾 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 min 取样分析, 样品分别标记为 m0, m15, m30, m45, m60, m75, m90, m105 和 m120。

1.3.2 煮制过程中汤汁主体风味分析 基于电子舌特定传感器会对某类化学物质产生特异性响应, 不同类型传感器阵列组合可以实现不同样品主体风味的特征分析, 参考文献[13, 21]的方法, 取 10.0 mL 汤汁于 4 °C 离心(5 000 r/min, 5 min)后取 2.0 mL 无油上清液, 装瓶密封后置于样品室检测。

试验做 3 次重复, 3 次重复样品混匀后做 5 个平行测试, 样品室内工作温度为 50 °C, 运行时间为 90 s, 均取 70 s 时数据进行分析。

1.3.3 煮制过程中汤汁味觉特性分析 参考文献[14]的方法, 将 20.0 mL 汤汁于 4 °C 离心(12 000 r/min, 10 min)后取中层澄清无油样品, 按照 1:5 质量比加入纯水, 均质混匀后离心(12 000 r/min, 5

min), 上清液过滤(0.22 μm)后上机检测。

检测条件: 样品体积为 60.0 mL, 基线调整时间为 30 s, 单样品测定周期为 330 s, 每次测试后使用基准液进行冲洗, 冲洗时间为 30 s, 采集时间为 30 s, 做 4 次重复, 取后 3 次数据进行分析。

试验做 3 次重复, 每次 3 个平行, 结果标记为: 平均值 \pm 标准差。

1.3.4 煮制过程中汤汁游离氨基酸含量分析 参考国家标准 GB/T 5009.124-2016^[22]和文献[23-24]的方法, 采用氨基酸自动分析仪进行氨基酸组分分析。

检测条件: 分离柱为 4.6 mm ID \times 60 mm L; 柱温为 57 °C; 检测波长为 440 nm 和 570 nm; 缓冲液流速为 0.4 mL/min; 反应液为茚三酮试剂, 流速为 0.35 mL/min; 进样量为 20 μL , 反应单元温度为 140 °C。

试验做 3 次重复, 每次 3 个平行, 结果标记为: 平均值 \pm 标准差。

1.3.5 煮制过程中汤汁挥发性成分分析 参考文献[14, 25-26]的方法, 略有修改, 均匀取 2.0 mL 汤汁, 经固相吸附柱富集后采用热脱附-气相色谱质谱联用仪进行挥发性物质组分分析。

固相吸附柱吸附工作条件为 50 °C, 恒温 30 min, 同时添加 0.182 μg 2-甲基-3-庚酮作为标准物质。

TDS 程序: 初始温度 40 °C, 以 40 °C/min 升温至 210 °C, 保持 5 min;

CIS 程序: 初始温度-100 °C, 以 10 °C/min 升温至 215 °C, 分流比为 20:1;

GC-MS 程序: 初始温度 40 °C, 以 5 °C/min 升温至 200 °C, 保持 1 min, 再以 10 °C/min 升温至 220 °C, 保持 3 min。氦气流速 1.0 mL/min, 质谱传输线温度 260 °C, 离子源温度 280 °C, 质量扫描范围 40~600 u。

试验做 3 次重复, 每次取 10.0 mL 样品混匀后取 2.0 mL 进行测试, 以 2-甲基-3-庚酮(99.9%, CAS 号 13019-20-0, 0.182 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$), 添加量为 1.0 μL 。

1.4 数据处理

运用 Winmuster 软件进行产品风味的主成分分析(Principal component analysis, PCA)和线性

判别分析 (Linear discriminant analysis, LDA); 在挥发性风味物质分析时, 依据挥发性成分 CAS 号进行化学物质检索分析 (<http://www.chemindex.com/>)。试验数据均由 SPSS 9.1 进行误差性分析 ($F=0.05$), 由 Origin8.0 进行作图。


2 结果与分析

2.1 熏马肠煮制过程中汤汁中游离氨基酸组分变化

氨基酸组分, 尤其是必需氨基酸含量, 是评价肉制品营养价值高低的重要依据, 同时也在风味呈现上起着重要作用^[23,27-29], 氨基酸也是功能特性呈现的重要载体^[30], 肉制品中的游离氨基酸含量受水解度等因素的影响^[31]。

熏马肠煮制过程中汤汁游离氨基酸组分如表 1、图 1 所示, 汤汁中游离氨基酸随煮制时间的延长逐渐增加, 其中 m0, m15, m30, m60, m75, m90 之间差异不显著 ($P>0.05$), m15, m30, m45, m60, m75, m90 之间差异不显著 ($P>0.05$), m30, m45, m60, m75, m90, m105, m120 之间差异不显著 ($P>0.05$), 其它组之间具有显著性差异 ($P<0.05$), m105 的游离氨基酸含量最大, 与 m120 差异不显著 ($P>0.05$)。

天冬氨酸、谷氨酸是呈现鲜味的主要成分^[32], 天冬氨酸含量与总氨基酸含量变化趋势相似, 随着煮制时间的延长而逐渐增加, m0 天冬氨酸含量最低, m0, m15, m30 之间差异不显著 ($P>0.05$),



注: a~c 表示具有显著性差异 ($P<0.05$)。

图 1 熏马肠煮制过程中汤汁总游离氨基酸含量变化
Fig.1 Variation of free amino acid content of smoked horse sausage soup during cooking

m15, m30, m60, m75 之间差异不显著 ($P>0.05$), m30, m45, m60, m75, m90 之间差异不显著 ($P>0.05$), m45, m60, m75, m90, m105 之间差异不显著 ($P>0.05$), m90, m105, m120 之间差异不显著 ($P>0.05$), 其它组样品均有显著性差异 ($P<0.05$), 其中 m120 的天冬氨酸含量最高; 谷氨酸含量随着煮制时间的延长而逐渐增加, m0 与 m15 之间差异不显著 ($P>0.05$), m15, m30, m75 之间差异不显著 ($P>0.05$), m30, m45, m60, m75, m90, m105, m120 之间差异不显著 ($P>0.05$), 其中 m120 的谷氨酸含量较高。

苏氨酸、天冬氨酸、丝氨酸、甘氨酸、丙氨酸、精氨酸、脯氨酸和羟脯氨酸是呈现甜味的主要成分, 精氨酸和脯氨酸是呈现苦味的主要物质^[32]。随着煮制时间的延长, 丙氨酸含量逐渐增加, m0 含量较低, 与 m15, m30 之间差异不显著 ($P>0.05$), m30, m45, m60, m75 之间差异不显著 ($P>0.05$), m45, m60, m75, m90, m105, m120 之间差异不显著 ($P>0.05$), 其中 m120 丙氨酸含量最高; 精氨酸、甘氨酸与之变化趋势相似, 总体呈增加趋势; 相较于 m0, m120 丝氨酸含量虽有所降低但不显著 ($P>0.05$); 脯氨酸、羟脯氨酸变化趋势不明显, m120 脯氨酸含量较高。

随着煮制时间的延长, 缬氨酸含量总体呈增加趋势, m0, m15 差异不显著 ($P>0.05$), m15, m30 差异不显著 ($P>0.05$), m30, m45, m60, m75 差异不显著 ($P>0.05$), m45, m60, m75, m90, m105, m120 差异不显著 ($P>0.05$), 其它组之间有着显著差异 ($P<0.05$); 其它如甲硫氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸, 亦与前述氨基酸变化趋势相似, 总体呈增加趋势; 汤汁中的半胱氨酸含量总体呈降低趋势, m0, m15, m45, m60, m75 差异不显著 ($P>0.05$), m15, m30, m45, m60, m75, m90, m105, m120 差异不显著 ($P>0.05$); 而赖氨酸变化趋势不明显, 总体来说, m120 赖氨酸含量较低。

如表 2 所示, 汤汁中呈鲜味、呈愉悦甜味、呈愉悦苦味的氨基酸百分比差异均不显著, 然而, 汤汁中氨基酸总量呈增加趋势, 即呈味氨基酸的含量随着煮制时间的延长而增加。常亚楠等^[33]在煮制鸡汤时, 亦发现鸡汤中游离氨基酸成分呈增加趋势; 刘登勇等^[34]在对扒鸡卤汤反复煮制时, 发现

表 1 熏马肠汤汁中游离氨基酸含量变化 (mg/100 g)
Table 1 Variation of free amino acid content of smoked horse sausage soup (mg/100 g)

名称	简称	味觉特征	样品组											
			m0	m15	m30	m45	m60	m75	m90	m105	m120			
天冬氨酸	Asp	甜/鲜(+)	0.10 ± 0.01 ^a	0.11 ± 0.00 ^{ab}	0.14 ± 0.01 ^{abc}	0.16 ± 0.01 ^{abc}	0.15 ± 0.00 ^{bcd}	0.14 ± 0.03 ^{bcd}	0.17 ± 0.00 ^{ab}	0.18 ± 0.03 ^{de}	0.19 ± 0.02 ^e			
苏氨酸	Thr	甜(+)	2.33 ± 0.29 ^b	2.24 ± 0.22 ^{ab}	2.26 ± 0.12 ^{ab}	2.25 ± 0.09 ^{ab}	2.05 ± 0.14 ^{ab}	1.80 ± 0.37 ^a	2.05 ± 0.14 ^{ab}	2.03 ± 0.01 ^{ab}	2.00 ± 0.03 ^{ab}			
丝氨酸	Ser	甜(+)	0.14 ± 0.01 ^a	0.21 ± 0.03 ^{ab}	0.25 ± 0.02 ^{ab}	0.30 ± 0.02 ^{ab}	0.29 ± 0.04 ^{ab}	0.37 ± 0.05 ^b	0.34 ± 0.00 ^{ab}	0.38 ± 0.01 ^{ab}	0.42 ± 0.04 ^{ab}			
谷氨酸	Glu	鲜(+)	6.60 ± 0.67 ^a	7.60 ± 0.33 ^{ab}	8.48 ± 0.77 ^{bc}	9.02 ± 0.30 ^c	9.13 ± 0.30 ^c	8.70 ± 0.93 ^{bc}	9.63 ± 0.40 ^c	9.54 ± 0.08 ^c	9.63 ± 0.06 ^c			
甘氨酸	Gly	甜(+)	1.81 ± 0.18 ^a	2.14 ± 0.11 ^{ab}	2.43 ± 0.24 ^{bc}	2.63 ± 0.10 ^{cd}	2.67 ± 0.09 ^{cd}	2.51 ± 0.33 ^{bcd}	2.86 ± 0.14 ^d	2.84 ± 0.01 ^{cd}	2.93 ± 0.02 ^d			
丙氨酸	Ala	甜(+)	8.46 ± 0.83 ^{ab}	10.15 ± 0.27 ^b	11.39 ± 1.16 ^{bc}	12.29 ± 0.44 ^{cd}	12.43 ± 0.45 ^{cd}	11.82 ± 1.45 ^{cd}	13.27 ± 0.54 ^d	13.13 ± 0.02 ^{cd}	13.37 ± 0.09 ^d			
半胱氨酸	Cys	苦/甜(-)	0.69 ± 0.00 ^b	0.34 ± 0.47 ^{ab}	0.02 ± 0.01 ^a	0.32 ± 0.41 ^{ab}	0.34 ± 0.39 ^{ab}	0.60 ± 0.01 ^{ab}	0.05 ± 0.03 ^a	0.02 ± 0.00 ^a	0.04 ± 0.03 ^a			
缬氨酸	Val	甜/苦(-)	4.02 ± 0.40 ^a	4.83 ± 0.18 ^{ab}	5.49 ± 0.60 ^{bc}	5.99 ± 0.24 ^{cd}	6.03 ± 0.27 ^{cd}	5.88 ± 0.66 ^{cd}	6.43 ± 0.33 ^d	6.48 ± 0.00 ^d	6.58 ± 0.02 ^d			
甲硫氨酸	Met	苦/甜(-)	1.55 ± 0.14 ^a	1.95 ± 0.06 ^b	2.18 ± 0.30 ^{bc}	2.36 ± 0.18 ^{bcd}	2.40 ± 0.19 ^{cd}	2.35 ± 0.28 ^{bcd}	2.63 ± 0.14 ^d	2.59 ± 0.09 ^{cd}	2.70 ± 0.00 ^d			
异亮氨酸	Ile	苦(-)	2.38 ± 0.22 ^a	2.90 ± 0.05 ^b	3.27 ± 0.38 ^{bc}	3.62 ± 0.15 ^{cd}	3.59 ± 0.20 ^{cd}	3.61 ± 0.38 ^{cd}	3.85 ± 0.24 ^d	3.93 ± 0.02 ^d	3.99 ± 0.07 ^d			
亮氨酸	Leu	苦(-)	7.97 ± 0.71 ^a	9.52 ± 0.31 ^{ab}	10.77 ± 1.09 ^{ab}	11.73 ± 0.39 ^b	11.93 ± 0.35 ^b	11.57 ± 1.20 ^{ab}	10.27 ± 4.09 ^{ab}	12.81 ± 0.03 ^b	13.07 ± 0.02 ^b			
酪氨酸	Tyr	苦(-)	0.43 ± 0.58 ^a	0.93 ± 0.03 ^b	1.05 ± 0.11 ^b	1.15 ± 0.04 ^b	1.15 ± 0.05 ^b	1.18 ± 0.07 ^b	1.19 ± 0.07 ^b	1.24 ± 0.02 ^b	1.26 ± 0.06 ^b			
苯丙氨酸	Phe	苦(-)	3.57 ± 0.34 ^a	4.83 ± 0.15 ^b	5.02 ± 0.51 ^{bc}	5.53 ± 0.22 ^{bcd}	5.62 ± 0.21 ^{cde}	5.42 ± 0.63 ^{cd}	6.04 ± 0.28 ^{de}	6.08 ± 0.04 ^{de}	6.25 ± 0.02 ^e			
赖氨酸	Lys	甜/苦(-)	4.63 ± 0.42 ^a	5.46 ± 0.20 ^a	6.19 ± 0.65 ^b	6.72 ± 0.23 ^a	6.77 ± 0.23 ^a	6.49 ± 0.72 ^a	3.70 ± 5.23 ^a	7.17 ± 0.06 ^a	3.66 ± 5.17 ^a			
组氨酸	His	苦(-)	1.22 ± 0.14 ^a	1.40 ± 0.04 ^{ab}	1.56 ± 0.17 ^{bc}	1.68 ± 0.06 ^{cd}	1.71 ± 0.03 ^{cd}	1.64 ± 0.15 ^{cd}	1.82 ± 0.04 ^d	1.82 ± 0.01 ^d	1.86 ± 0.02 ^d			
精氨酸	Arg	甜/苦(+)	0.75 ± 0.06 ^a	0.95 ± 0.07 ^{ab}	1.11 ± 0.14 ^{bc}	1.20 ± 0.06 ^{cd}	1.23 ± 0.01 ^{cd}	1.20 ± 0.15 ^{cd}	1.37 ± 0.06 ^d	1.36 ± 0.01 ^d	1.38 ± 0.02 ^d			
脯氨酸	Pro	甜/苦(+)	14.86 ± 1.35	9.59 ± 12.76	17.86 ± 0.24	17.41 ± 0.94	9.44 ± 11.31	18.39 ± 0.03	17.16 ± 0.61	19.39 ± 0.52	19.03 ± 2.03			
羟脯氨酸	Hypro	甜(+)	0.12 ± 0.01	0.03 ± 0.04	0.11 ± 0.02	0.05 ± 0.04	0.14 ± 0.01	0.12 ± 0.01	0.10 ± 0.09	0.15 ± 0.05	0.10 ± 0.10			
总计			61.62 ± 6.32 ^a	64.73 ± 14.30 ^{ab}	79.57 ± 5.99 ^{abc}	84.82 ± 3.82 ^{bc}	77.06 ± 14.27 ^{abc}	83.80 ± 7.33 ^{abc}	82.93 ± 11.14 ^{abc}	91.14 ± 0.59 ^c	88.47 ± 7.33 ^c			

注: +, 表示味道愉悦, -, 表示味道不愉悦; 同行肩标 a-e 表示具有显著性差异 (P<0.05)。

表2 熏马肠汤汁中呈味氨基酸百分比(mg/100 g)

项目	样品组											
	m0	m15	m30	m45	m60	m75	m90	m105	m120			
呈愉悦甜味氨基酸百分比/%	46.37 ± 0.33	37.92 ± 12.36	44.74 ± 1.58	43.00 ± 0.06	36.01 ± 8.97	43.43 ± 1.05	45.39 ± 5.66	43.29 ± 0.26	44.62 ± 1.35			
呈鲜味氨基酸百分比/%	10.87 ± 0.01	12.15 ± 2.17	10.82 ± 0.17	10.87 ± 0.14	12.22 ± 1.88	10.55 ± 0.23	11.90 ± 1.11	10.66 ± 0.05	11.15 ± 0.96			
呈愉悦苦味氨基酸百分比/%	25.34 ± 0.30	14.45 ± 16.63	23.91 ± 1.93	22.05 ± 0.18	12.70 ± 12.34	23.46 ± 1.84	22.59 ± 3.70	22.76 ± 0.42	23.06 ± 0.36			

表3 熏马肠汤汁味觉特性变化

滋味	样品组											
	m0	m15	m30	m45	m60	m75	m90	m105	m120			
苦味	0.43 ± 0.04 ^a	0.81 ± 0.03 ^{bc}	0.62 ± 0.08 ^{abc}	0.84 ± 0.10 ^{bc}	0.43 ± 0.05 ^a	0.33 ± 0.07 ^a	0.57 ± 0.42 ^{ab}	0.94 ± 0.04 ^c	0.61 ± 0.27 ^{ab}			
苦味回味	0.26 ± 0.07 ^b	-0.24 ± 0.10 ^a	1.30 ± 0.08 ^d	4.98 ± 0.05 ^e	0.04 ± 0.26 ^b	1.86 ± 0.26 ^c	0.88 ± 0.08 ^c	0.83 ± 0.09 ^c	2.05 ± 0.09 ^f			
涩味	0.60 ± 0.05 ^{ab}	0.39 ± 0.05 ^a	1.63 ± 0.12 ^c	0.40 ± 0.03 ^a	0.42 ± 0.02 ^a	0.61 ± 0.03 ^b	2.02 ± 0.06 ^d	0.54 ± 0.01 ^{ab}	2.68 ± 0.23 ^e			
涩味回味	-0.12 ± 0.04 ^{ab}	-0.18 ± 0.03 ^a	0.53 ± 0.02 ^d	-0.12 ± 0.04 ^{ab}	-0.10 ± 0.05 ^b	0.02 ± 0.05 ^c	0.79 ± 0.03 ^c	-0.01 ± 0.03 ^c	1.03 ± 0.03 ^f			
鲜味	5.59 ± 0.03 ^a	6.65 ± 0.06 ^b	7.41 ± 0.13 ^c	7.57 ± 0.04 ^{cd}	7.95 ± 0.39 ^{de}	8.19 ± 0.46 ^e	7.99 ± 0.15 ^{de}	7.87 ± 0.09 ^{de}	8.60 ± 0.20 ^f			
丰富度	1.33 ± 0.05 ^a	1.33 ± 0.03 ^a	1.38 ± 0.06 ^{abc}	1.35 ± 0.05 ^{ab}	1.42 ± 0.05 ^{abc}	1.48 ± 0.11 ^{bc}	1.49 ± 0.10 ^b	1.42 ± 0.08 ^{abc}	1.64 ± 0.09 ^d			
咸味	-4.90 ± 0.02 ^a	-3.85 ± 0.02 ^a	-3.11 ± 0.01 ^{abc}	-3.06 ± 0.01 ^{ab}	-2.94 ± 0.02 ^{abc}	-2.76 ± 0.04 ^{bc}	-2.62 ± 0.02 ^c	-2.96 ± 0.02 ^{abc}	-1.76 ± 0.04 ^d			

注:同行肩标 a-g 表示具有显著性差异 ($P < 0.05$)。

煮制次数越多游离氨基酸含量越多;Buscaillon 等^[35]在火腿成熟过程中,发现游离氨基酸含量会从 3.6% 迅速增加到 16.6%, 在终产品中含量为 4.4%, 呈增加趋势, 与本文结果相似。

2.2 熏马肠煮制过程中汤汁味觉特性变化

味觉特性是肉制品重要的质量属性之一, 也是决定消费者再次购买的重要参考^[36], 采用阵列传感器开展食品味觉的分析, 是味觉特性的重要量化手段之一^[37]。熏马肠煮制过程中, 呈味物质释放过程如表 3 所示, 在煮制过程中, 咸味值呈增加趋势, 其中 m0, m15, m30, m45, m60, m105 之间差异不显著 ($P>0.05$), m30, m45, m60, m75, m105 之间差异不显著 ($P>0.05$), m30, m60, m75, m90, m105, m120 之间差异不显著 ($P>0.05$), m120 咸味值最高, 与其它组具有显著性差异 ($P<0.05$); 鲜味物质的释放过程也呈增加趋势, 其中 m0 鲜味值最低, m120 鲜味值最高, 均与其它组有显著差异 ($P<0.05$), m15 和 m30 差异不显著 ($P>0.05$), m45, m60, m90, m105 之间差异不显著 ($P>0.05$), m60, m75, m90, m105 之间差异不显著 ($P>0.05$); 汤汁的味觉丰富度呈增加趋势, m120 的味觉丰富度最高 ($P<0.05$), m0, m15, m30, m45, m60, m105 之间差异不显著 ($P>0.05$), m30, m45, m60, m75, m105 之间差异不显著 ($P>0.05$), m30, m60, m75, m90, m105 之间差异不显著 ($P>0.05$); 汤汁的苦味值随着煮制时间的延长而逐渐增加, 其中, m75 的苦味值最小, 与 m0 没有显著差异 ($P>0.05$), m30, m60, m90, m120 的苦味值高于 m0, 差异不显著 ($P>0.05$),

m15, m30, m45, m90, m120 的苦味值差异不显著 ($P>0.05$), m15, m30, m45, m105 的苦味值差异不显著 ($P>0.05$); 汤汁的苦味回味值变化趋势不明显, 其中 m15 的苦味回味值最低 ($P<0.05$), m45 的苦味回味值最高 ($P<0.05$); 汤汁的涩味值和涩味回味值变化趋势不明显, 其中 m120 的涩味值最高 ($P<0.05$), 涩味回味值也最高 ($P<0.05$)。

游离氨基酸具有显著的呈味作用^[38], 盐分含量与游离氨基酸含量具有显著的正相关^[39-40], 熏马肠煮制过程中汤汁咸味值呈增加趋势, 与 2.1 节中游离氨基酸总量的变化趋势相似。产品的涩味值会受其它组分的影响, 如蔗糖、氯化钠、柠檬酸或咖啡因^[41], 而本文中涩味值未呈现规律性变化, 可能与煮制过程中发生的水解作用等因素有关^[42]。

2.3 熏马肠煮制过程中汤汁主体风味变化

熏马肠煮制过程中汤汁主体风味差异如图 2 所示, 由主成分分析结果显示, 各样品在 PC1 与 PC2 的中方差贡献率为 97.06%, 具有良好的独立性, 风味主体成分能代表各自产品的风味特征。m0, m120 与其它组均无交集, m15 与 m45 有微小交集, m30, m45, m60 和 m75 存在不同程度的交集, m90 和 m105 存在部分交集, 即煮制加工对汤汁主体风味成分产生了影响, 其中 m15, m30, m45, m60 和 m75 较为相似。煮制时间达到 90 min 后, 汤汁主体风味成分发生了显著变化, 然而与煮制 105 min 仍有相同组分, 当煮制时间达到 120 min 时, 主体风味成分与其它组均有显著差异, 与




图 2 熏马肠煮制过程中汤中的主体风味特征分析

Fig.2 Main flavor characteristics analysis of smoked horse sausage soup during cooking

2.1 节中游离氨基酸含量的变化趋势相似。样品在 LD1 和 LD2 方向上的总方差贡献率为 85.27%, 且在 LD1 和 LD2 方向上, 虽然部分样品组存在部分交集, 但是均能够进行样品区分, 即随煮制时间的延长, 汤汁主体风味成分发生变化, 通过风味主成分分析能够对不同组样品进行识别分析, 与 2.1 节中游离氨基酸含量变化趋势相似。

2.4 熏马肠煮制过程中汤汁挥发性物质组分变化

熏马肠煮制过程中汤汁挥发性成分见表 4、图 3 所示, 汤汁中的挥发性物质含量呈先增加后降低的趋势, 其中 m15 挥发性物质含量最高, 尤其是酚类和芳香族类物质的含量较高, 这些物质也是金华火腿^[43]、清爽型黄酒^[44]等食品的重要风味成分。2.1 节中游离氨基酸含量呈增加趋势, 其中 m105 含量较高, 而汤汁中挥发性物质含量在后期呈降低趋势, 其中 m120 含量最低, 说明煮制时间的延长有助于汤汁滋味的丰富, 然而不利于香味的保留。

汤汁挥发性风味成分中, 均检测到的组分为苯甲醛、软脂酸甲酯, 两者均为重要的香气成分^[45-46], 其中苯甲醛含量呈降低趋势, 软脂酸甲酯的含量则呈先增加后降低的趋势。所有样品中均检测出己醛, 己醛是脂肪氧化的产物之一, 其含量




图 3 熏马肠汤汁挥发性物质含量变化

Fig.3 Variation of volatile substances of smoked horse sausage soup

与氧化程度有关^[47-48], 说明熏马肠样品制备过程中发生了氧化反应, 且脂肪氧化产物在猪肉制品主体风味形成上有重要作用^[49]。各组产品挥发性物质组分存在差异, 说明改变煮制时间可以获得不同风味的产品, 与 2.3 节的结果一致。

汤汁中尚存在 2-癸烯-1-醇、正戊醇、2-乙基己醇、十二醛等变化趋势不明显的挥发性物质, 这与熏马肠的加工过程及其原辅料的添加有关, 也与复杂的微生物菌相有关^[8], 造就了熏马肠独特的风味特征。

表 4 熏马肠煮制过程中汤中的挥发性物质 (ng)

Table 4 Volatile substances content of smoked horse sausage soup during cooking (ng)

编号	挥发性物质	样品组								
		m0	m15	m30	m45	m60	m75	m90	m105	m120
1	乙醇	-	0.57	1.83	11.06	-	0.73	1.23	-	-
2	正戊醇	-	0.77	2.56	3.84	-	-	-	-	-
3	2-丙基-1-戊醇	-	11.61	-	4.41	-	2.92	-	-	2.82
4	糠醇	-	17.10	-	4.37	8.02	7.74	6.22	6.34	3.89
5	喇叭茶醇	-	26.32	-	16.89	-	-	-	-	4.94
6	2-乙基己醇	35.68	-	9.29	-	-	-	2.54	3.17	-
7	2-癸烯-1-醇	-	-	11.33	5.93	-	-	-	-	-
8	2-乙基己醇	-	-	-	-	4.99	-	-	-	1.63
9	Z-2,4-癸二烯醛	-	10.71	7.76	-	5.53	6.60	5.03	10.66	6.28
10	Z-2-癸烯醛	-	6.92	4.47	2.64	-	5.03	3.81	3.76	3.11
11	苯甲醛	31.57	17.26	9.82	4.95	10.41	10.29	7.23	10.18	5.72
12	正辛醛	10.51	2.99	1.39	2.05	-	1.34	0.97	0.68	0.77
13	己醛	5.06	3.89	2.29	3.28	0.73	0.43	0.67	0.95	1.01
14	壬醛	-	9.20	7.18	14.09	3.88	6.03	4.37	5.42	3.44

(续表4)

编号	挥发性物质	样品组								
		m0	m15	m30	m45	m60	m75	m90	m105	m120
15	2-辛烯醛	-	5.88	-	-	1.98	-	1.37	-	-
16	糠醛	11.67	3.44	1.75	-	2.02	1.61	-	-	-
17	2-十二烯醛	-	6.03	6.87	6.38	-	3.74	3.22	5.76	2.82
18	十二醛	97.68	-	7.41	-	-	-	6.92	5.19	6.33
19	2,4-二甲基苯甲醛	-	-	-	-	-	6.28	4.22	-	4.18
20	蝶呤-6-羧酸	-	1.04	-	-	3.07	-	1.01	-	-
21	乙酸	10.83	-	0.33	-	-	1.77	3.81	-	1.10
22	6-十八碳烯酸甲酯	-	-	-	19.20	2.96	24.85	13.83	-	-
23	6,9,12,15-二十二碳四烯酸甲酯	3.33	-	9.51	-	-	-	-	8.46	-
24	12,15-十八二炔酸甲酯	99.87	9.49	0.35	2.33	-	1.73	1.35	2.01	0.37
25	软脂酸甲酯	71.10	80.21	46.20	6.22	120.98	28.25	8.44	11.11	9.80
26	2,2,4-三甲基戊二醇异丁酯	-	32.66	14.71	6.42	-	-	-	-	-
27	丁二酸二异丁酯	-	-	7.41	-	-	-	-	-	-
28	苯甲酸乙基己酯	48.67	-	17.97	17.66	-	-	-	34.56	-
29	豆蔻酸异丙酯	12.46	-	6.65	-	-	-	-	-	-
30	6-十八碳烯酸-甲酯	-	-	33.11	-	-	-	-	13.12	-
31	乙酸乙酯	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-
32	4-苯氧基丁酸乙酯	-	-	-	75.23	-	-	-	-	-
33	9-己癸酸乙酯	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72
34	十六烷	41.93	-	8.92	3.34	-	-	1.44	8.54	-
35	4,4-二甲基-环戊烯	-	7.02	-	-	-	-	-	-	-
36	5十八烯	-	-	2.13	-	3.51	-	-	-	-
37	环辛四烯	-	-	1.12	-	-	-	-	-	-
38	2,3-二甲基-2-环戊烯酮	-	11.15	5.19	6.05	-	3.74	3.10	-	2.01
39	2-环戊烯酮	-	2.57	-	-	-	-	0.69	-	0.53
40	2-甲氧基-4-乙基苯酚	10.01	-	17.12	13.69	10.50	-	-	-	-
41	2-甲氧基-5-甲基苯酚	-	92.27	-	-	-	47.46	-	20.61	11.84
42	苯酚	-	216.07	-	-	119.11	131.40	72.37	-	-
43	3,4-二甲氧基甲苯	-	6.73	4.07	-	1.55	3.04	1.82	2.94	1.42
44	3-甲基-苯酚	-	292.93	51.01	36.20	101.66	132.94	74.71	109.28	54.05
45	2,6-二甲基-苯酚	-	29.24	6.84	30.13	20.82	13.44	23.55	6.87	27.65
46	2-乙基-5-甲基苯酚	-	8.31	-	1.84	-	-	22.19	-	4.60
47	2,6-二甲氧基苯酚	-	-	-	-	-	-	5.69	6.24	4.81
48	邻异丙基甲苯	18.31	-	-	-	-	-	-	-	-
49	愈创木酚	-	61.30	34.58	23.76	37.05	25.37	15.92	16.06	9.58
50	3-甲氧基吡啶	-	3.01	-	0.66	-	1.39	0.71	-	-
51	2-乙酰基咪喃	-	8.80	3.53	3.41	5.18	3.11	1.46	1.18	0.74
52	氧化茛	-	0.92	-	-	-	-	-	-	-
	总含量	994.62	1240.52	568.74	538.29	626.90	579.80	377.88	421.79	236.90

注: -, 表示未检出。

3 结论

1) 通过对熏马肠煮制过程中的滋味和风味物质释放进行研究,表明汤汁煮制时间不同形成不同的挥发性物质组分,均具有独特的风味特征,通过风味主体成分分析能够对不同产品进行区分。依据挥发性成分中含量及变化,PC1为酚类和芳香族类化合物呈现的特征,其次是酯类或醛类。汤汁中游离氨基酸含量随着煮制时间的延长而增加,而呈鲜味氨基酸、呈愉悦甜味氨基酸和呈愉悦苦味氨基酸的百分比差异不显著。汤汁咸味值、丰富度、鲜味值均呈逐渐升高的趋势,苦味值、苦味回味值、涩味回味值变化不规律,煮制120 min时涩味值显著升高。

2) 熏马肠煮制过程中,汤汁味觉特征越来越明显,而风味强度会逐渐降低,即汤汁最终呈现给消费者的主要是味觉享受。结合煮制过程中游离氨基酸含量、滋味特征、风味特性的变化,煮制105 min时,汤汁中的游离氨基酸含量较多,风味物质得到一定保持,咸味值、鲜味值和丰富度均处于较高水平,且此时汤汁的涩味没有明显增加,较适宜作为加工参数。

参 考 文 献

- [1] 张应平, 别刊·哈那艾提. 哈萨克物质民俗文化与伊犁旅游事业的发展[J]. 北方经济, 2009(7): 59-60.
- [2] 国家发展改革委, 外交部, 商务部. 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动[EB/OL]. (2015-03-28)[2019-02-16]. http://www.xinhuanet.com/world/2015-03/28/c_1114793986.htm.
- [3] 菇克亚木·阿木提. 新疆清真食品品牌战略研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2013.
- [4] 阿不都艾尼, 李曦辉. “丝绸之路经济带”战略背景下振兴和发展新疆清真食品工业的思考[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2015, 42(6): 94-99.
- [5] 孔令明, 李芳, 徐洁洁, 等. 熏马肠制作过程中腌制工艺优化[J]. 食品与机械, 2013, 29(4): 176-181.
- [6] 张海萍, 李开雄, 卢士玲, 等. 新疆熏马肠中生物胺含量的调查[J]. 食品与发酵工业, 2012, 38(11): 152-156.
- [7] 马宇霞, 卢士玲, 李开雄, 等. 熏马肠中生物胺氧化酶菌株的筛选与鉴定[J]. 现代食品科技, 2014, 30(5): 49-55.
- [8] 李蕊婷, 卢士玲, 李开雄, 等. 新疆熏马肠中产氨基酸脱羧酶优势细菌的分离及鉴定[J]. 现代食品科技, 2014, 30(9): 85-91.
- [9] 马宇霞, 卢士玲, 李开雄, 等. 发酵剂对熏马肠成熟过程中生物胺含量变化的影响[J]. 食品与发酵工业, 2014, 40(2): 55-59.
- [10] 王静云, 卢士玲, 王庆玲. 发酵剂对熏马肠脂肪氧化的影响[J]. 食品与发酵工业, 2015, 41(2): 123-128.
- [11] 王静云, 卢士玲, 王庆玲. 发酵剂对熏马肠脂肪酶活力的影响[J]. 食品工业科技, 2015, 36(12): 185-188.
- [12] 韩鲜娜, 卢士玲, 李开雄, 等. 发酵剂对熏马肠挥发性风味化合物的影响[J]. 食品与发酵工业, 2013, 39(5): 200-206.
- [13] 刘文营, 李享, 成晓瑜. 添加西兰花种子水提物改善腊肉色泽和风味提高抗氧化性[J]. 农业工程学报, 2018, 34(21): 288-294.
- [14] 李享, 李瑞丽, 刘文营, 等. 市售壹号土猪肉理化品质及其熟制品感官特性分析[J]. 食品研究与开发, 2019, 40(1): 41-45.
- [15] 刘文营. 茶多酚、甘草提取物、VE和鼠尾草对羊肉乳化香肠品质的影响[J]. 食品科学, 2017, 38(9): 46-52.
- [16] XU L, YU X, LEI L, et al. A novel method for qualitative analysis of edible oil oxidation using an electronic nose[J]. Food Chemistry, 2016, 202: 229-235.
- [17] MANCINI S, PACI G, FRATINI F, et al. Improving pork burgers quality using *Zingiber officinale Roscoe* powder (ginger) [J]. Meat Science, 2017, 129: 161-168.
- [18] GAMERO-NEGRÓN R, GARCÍA C, REINA R, et al. Immune-spaying as an alternative to surgical spaying in Iberian x Duroc females: Effect on the sensory traits and volatile organic compound profile of dry-cured shoulders and dry-cured loins[J]. Meat Science, 2018, 143: 237-241.
- [19] JOSE C G, JACOB R H, PETHICK D W, et al. A supply chain approach to improving the shelf life of lamb meat; vitamin e concentration, electrical stimulation, ageing period and packaging system[J]. Meat Science, 2018, 139: 65-73.
- [20] 刘文营, 张振琪, 成晓瑜, 等. 干腌咸肉加工过程

- 中品质特性及挥发性成分的变化[J]. 肉类研究, 2016, 30(1): 6-10.
- [21] YAO Y, PAN S, FAN G, et al. Evaluation of volatile profile of Sichuan dongcai, a traditional salted vegetable, by SPME-GC-MS and E-nose[J]. LWT-Food Science and Technology, 2015, 64(2): 528-535.
- [22] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品中氨基酸的测定: GB/T 5009.124-2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.
- [23] 赵功玲, 梁新红, 郭延成, 等. 萝卜籽粕蛋白质的组成及功能性质[J]. 食品科学, 2018, 39(3): 117-122.
- [24] 施文正, 方林, 吴旭干, 等. 我国沿海主要海域雌性三疣梭子蟹呈味成分含量的比较[J]. 食品科学, 2017, 38(16): 127-133.
- [25] WANG Y, LI X, JIANG Q, et al. GC-MS analysis of the volatile constituents in the leaves of 14 compositae plants[J]. Molecules, 2018, 23(1): 166.
- [26] 李迎楠, 李享, 贾晓云, 等. 酶法制备血红素对湘式腊肠色泽和挥发性风味的影响[J]. 肉类研究, 2017, 31(11): 45-52.
- [27] LOPES A F, ALFAIA C M M, PARTIDÁRIO A M C P C, et al. Influence of household cooking methods on amino acids and minerals of Barrosã-PDO veal[J]. Meat Science, 2015, 99: 38-43.
- [28] CARVALHO L T, PIRES M A, BALDIN J C, et al. Partial replacement of meat and fat with hydrated wheat fiber in beef burgers decreases caloric value without reducing the feeling of satiety after consumption[J]. Meat Science, 2019, 147: 53-59.
- [29] RIZZI G P. The strecker degradation of amino acids: Newer avenues for flavor formation[J]. Food Reviews International, 2008, 24(4): 416-435.
- [30] QUAN H, HUANG S, WU Y, et al. Comparative study on the composition of free amino acids and derivatives in the two botanical origins of an edible Chinese herb "Xiebai", i.e. *Allium chinense* G. Don and *Allium macrostemon* Bunge species[J]. Food Research International, 2018, 106: 446-457.
- [31] PÉREZ-SANTAESCOLÁSTICA C, CARBALLO J, FULLADOSA E, et al. Effect of proteolysis index level on instrumental adhesiveness, free amino acids content and volatile compounds profile of dry-cured ham[J]. Food Research International, 2018, 107: 559-566.
- [32] 方林, 施文正, 刁玉段, 等. 冻结方式对不同部位草鱼呈味物质的影响[J]. 食品科学, 2018, 39(12): 199-204.
- [33] 常亚楠, 赵改名, 柳艳霞, 等. 煮制对鸡肉及汤汁中游离氨基酸的影响[J]. 食品工业科技, 2014, 35(9): 333-337, 342.
- [34] 刘登勇, 刘欢, 张庆永, 等. 扒鸡卤汤反复煮制过程中主要非盐呈味物质的累积效应[J]. 食品工业科技, 2018, 39(19): 64-69, 75.
- [35] BUSCAILHON S, MONIN G, CORNET M, et al. Time-related changes in nitrogen fractions and free amino acids of lean tissue of French dry-cured ham[J]. Meat Science, 1994, 37(3): 449-56.
- [36] NGAPO T M. Consumer preferences for pork chops in five Canadian provinces[J]. Meat Science, 2017, 129: 102-110.
- [37] HAN Y, WANG X, CAI Y, et al. Sensor-array-based evaluation and grading of beef taste quality[J]. Meat Science, 2017, 129: 38-42.
- [38] NISHIMURA T, KATO H. Taste of free amino acids and peptides[J]. Food Reviews International, 1988, 4(2): 175-194.
- [39] 吴燕燕, 曹松敏, 李来好, 等. 蓝圆鲹腌干工艺中组织蛋白酶与游离氨基酸和滋味形成的关系[J]. 食品科学, 2018, 39(4): 13-19.
- [40] MARTÍN L, ANTEQUERA T, VENTANAS J, et al. Free amino acids and other non-volatile compounds formed during processing of Iberian ham[J]. Meat Science, 2001, 59(4): 363-368.
- [41] BRANNAN G D, SETSER C S, KEMP K E. Interaction of astringency and taste characteristics [J]. Journal of Sensory Studies, 2010, 16(2): 179-197.
- [42] OJHA K S, ALVAREZ C, KUMAR P, et al. Effect of enzymatic hydrolysis on the production of free amino acids from boarfish (*Capros aper*) using second order polynomial regression models [J]. LWT-Food Science and Technology, 2016, 68: 470-476.
- [43] 赵改名, 柳艳霞, 田玮, 等. 金华火腿中挥发性风味物质形成过程及变化规律研究[J]. 食品与发酵工业, 2007, 33(5): 120-125.
- [44] 罗涛. 清爽型黄酒香气特征及麦曲对其香气的影响[D]. 无锡: 江南大学, 2008.
- [45] VERMA R S, PADALIA R C, SINGH V R, et al. Natural benzaldehyde from *Prunus persica* (L.) Batsch[J]. International Journal of Food Properties, 2017, 20(2): 1259-1263.

- [46] 姚珊珊, 郭雯飞. 桂花龙井茶和柚子花茶的香气成分[J]. 茶叶, 2005, 31(4): 228-232.
- [47] MUNEKATA P E S, DOMÍNGUEZ R, FRANCO D, et al. Effect of natural antioxidants in Spanish salchichón elaborated with encapsulated n-3 long chain fatty acids in konjac glucomannan matrix[J]. Meat Science, 2017, 124: 54-60.
- [48] LIU P, WANG S, ZHANG H, et al. Influence of glycated nitrosohaemoglobin prepared from porcine blood cell on physicochemical properties, microbial growth and flavour formation of Harbin dry sausages[J]. Meat Science, 2019, 148: 96-104.
- [49] LORENZO, JOSÉ M, CARBALLO J. Changes in physico-chemical properties and volatile compounds throughout the manufacturing process of dry-cured foal loin[J]. Meat Science, 2015, 99: 44-51.

Analysis of Free Amino Acids and Volatile Flavor Substances during Cooking of Smoked Horse Sausage Prepared in Kazakh Region of Xinjiang

Liu Wenying¹ Li Kaixiong² Wang Shouwei^{*} Li Xiang¹ Cheng Xiaoyu¹ Qiao Xiaoling¹

(¹China Meat Research Center, National Meat Processing Engineering Technology Research Center, Beijing Academy of Food Sciences, Beijing 100068

²Food College, Shihezi University, Shihezi 832003, Xinjiang)

Abstract The smoked horse sausage is a traditional meat product which is popular among Kazakhs, and both the cooked smoked horse sausage and mature liquid are well welcomed. In order to quantify the taste and flavor change of the smoked horse sausage during cooking, the main flavor, free amino acids, taste characteristics and volatile flavor substances of samples sampled at different cooking time were analyzed. Results showed that the total amount of free amino acids in soup presented an increasing trend, the total free amino acids of products cooked for 105 min and 120 min were significantly higher than that of the initial sample ($P < 0.05$). The influences of cooking time on the proportion of umami taste amino acid, sweet taste amino acid and bitter taste amino acid was not significant ($P > 0.05$). The saltiness value, umami value, richness, bitterness value and bitter aftertaste value of the soup showed an increasing trend with the prolongation of cooking time, while the astringency value and the astringency aftertaste value showed no obvious change. The volatile components of the soup were significantly different in different cooking times, the total amount of volatile substances showed a trend of decreasing after increasing. The variance contribution rate of the main flavor components of the soup on PC1 and PC2 was 97.06%, each product had its own flavor characteristics, and the variance contribution rate on LD1 and LD2 was 85.27%, which mean the different samples could be effectively distinguished by principal component analysis. The content of free amino acid was higher when cooked for 105 min, the main flavor was maintained to some extent, and the degree of astringency was not significantly increased. Suitable processing parameter was obtained after cooking for 105 min, the results provide reference for cooking, processing and consumption of smoked horse sausage, as well as for further research on the flavor and taste of smoked horse sausage.

Keywords smoked horse sausage; free amino acids; main flavor; volatile flavor compounds; taste characteristics