

蓝蛤超高压辅助酶解工艺研究

步莹¹, 王飞¹, 胡显杰^{1,2}, 朱文慧^{1*}, 李学鹏¹, 毕蕾³, 王玉亭⁴

(1. 渤海大学 食品科学与工程学院, 生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术国家地方联合工程研究中心, 辽宁 锦州 121013; 2. 大连工业大学 海洋食品精深加工关键技术省部共建协同创新中心, 辽宁 大连 116034; 3. 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司, 辽宁 抚顺 113122; 4. 荣成协汇食品股份有限公司, 山东 荣成 246309)

摘要:以蓝蛤为原料,采用正交试验优化超高压酶解条件,通过感官、电子鼻和电子舌等分析超高压对酶解液风味的影响。结果表明,在250 MPa压力下处理60 min后得到的酶解液风味最佳,在此条件下氨基酸态氮含量为0.39 g/dL,水解度为45.09%。经感官评价、电子鼻和电子舌分析,超高压处理酶解液苦腥味降低,鲜味值增大,酶解液味道鲜美,品质佳,超高压辅助酶解是制备优质海鲜调味基料的一种新型技术。

关键词:蓝蛤;超高压;酶解工艺;风味

中图分类号:TS201.1

文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1000-9973.2021.01.011

文章编号:1000-9973(2021)01-0057-06

Study on Ultra-high Pressure Assisted Enzymatic Hydrolysis Process of *Aloididae aloidii*

BU Ying¹, WANG Fei¹, HU Xian-jie^{1,2}, ZHU Wen-hui^{1*}, LI Xue-peng¹, BI Lei³, WANG Yu-ting⁴

(1. National & Local Joint Engineering Research Center of Storage, Processing and Safety Control Technology for Fresh Agricultural and Aquatic Products, College of Food Science and Engineering, Bohai University, Jinzhou 121013, China; 2. Collaborative Innovation Center of Marine Food Deep Processing Key Technologies Jointly Built by Provincial Departments, Dalian Polytechnic University, Dalian 116034, China; 3. Dufengxuan Gushen Biological Technology Co., Ltd., Fushun 113122, China; 4. Rongcheng Xiehui Foods Co., Ltd., Rongcheng 264309, China)

Abstract: Using *Aloididae aloidii* as the raw material, orthogonal experiment is used to optimize the conditions of ultra-high pressure enzymatic hydrolysis. The effect of ultra-high pressure on the flavor of enzymatic hydrolysate is analyzed by sensory, electronic nose and electronic tongue. The results show that the best flavor is obtained at 250 MPa pressure with 60 min treatment. Under these conditions, the content of amino acid nitrogen is 0.39 g/dL and the degree of hydrolysis is 45.09%. Through sensory evaluation, electronic nose and electronic tongue analysis, the bitterness and fishy smell of the enzymatic hydrolysate treated with ultra-high pressure are decreased and the value of umami is increased, and the taste and quality of the enzymatic hydrolysate are good. Ultra-high pressure assisted enzymatic hydrolysis is a new technology for preparing high-quality seafood seasoning.

Key words: *Aloididae aloidii*; ultra-high pressure; enzymatic hydrolysis; flavor

收稿日期:2020-07-26

* 通讯作者

基金项目:“十三五”国家重点研发计划项目(2016YFD0400705);辽宁兴辽英才项目(XLYC1807133)

作者简介:步莹(1981-),男,工程师,硕士,研究方向:水产品加工及贮藏;

朱文慧(1982-),女,副教授,博士,研究方向:水产品加工及贮藏。

我国是世界上最大的贝类养殖国,贝类养殖已经成为沿海海水养殖业的支柱之一。据统计,2018 年我国海水养殖贝类总产量达 1463.51 万吨,占贝类总产量的 91.93%,其中,蛤类占海水养殖贝类总产量的 27.88%^[1]。蓝蛤(*Aloididae aloidii*)是盛产于我国沿海的一种低值海洋贝类。蓝蛤肉肉质鲜美,营养丰富,且粗蛋白含量相比其他贝类较高,因此成为酶法制备呈味肽的优质原料^[2]。水产蛋白质在酶水解后经常会产生苦味,使用传统的化学和热处理脱腥脱苦方法会严重破坏水产品品质和营养价值^[3],这使得酶法水解在水产工业上的应用受到了较大的限制。

超高压(*ultra-high pressure, UHP*)在水产品加工行业逐渐受到关注,Kaur 等^[4]在室温(25±2)℃条件下,研究了不同压力处理后黑虎虾的品质及货架期变化;邵懿等研究发现,100 MPa 高压有利于鳀鱼内源酶对鳀鱼蛋白的水解,外加风味蛋白酶对高压辅助水解效果有加强作用。Maria 等^[5]研究发现,超高压处理能够增加球蛋白的水解度,在 400 MPa 下处理 25 min 达到最大水解度。然而,针对超高压同时处理底物和酶的酶解工艺相关的系统研究,在水产方面鲜见报道。

鉴于此,本研究以蓝蛤为研究对象,利用超高压对其进行高压酶解处理,旨在完善和丰富超高压在水产应用方面的基础理论,为超高压酶解的加工利用提供了理论依据。

1 材料与方 法

1.1 材料与试剂

蓝蛤(鲜活):购于锦州市林西水产市场;风味蛋白酶(500 mg)、复合风味蛋白酶(11039):食品级,北京市诺维信投资有限公司;0.05 mol/L 氢氧化钠标准滴定溶液:天津市光复精细化工研究所。

1.2 仪器与设备

HPP. L2-600/0.6 超高压设备 天津华泰森森公司;HH-4 数显恒温水浴锅 常州国华电器有限公司;Biofuge Stratos 台式冷冻高速离心机 美国 Thermo Fisher 公司;Kjeltec 8400 全自动定氮仪 瑞典 Foss 公司;SA-402B 电子舌 日本 Insent 公司;PEN3 电子鼻 德国 Airsense 公司。

1.3 酶解液的制备

将鲜活的蓝蛤静置于 4% 的人工海水(海水晶配制)中吐沙,每隔 2 h 换 1 次水溶液,至吐沙完成,捞起,沥干,冷冻。在 0℃ 下去壳取肉,打碎,以料水比 1:1,选取复合蛋白酶和风味蛋白酶,加压或不加压处

理,在酶解温度 50℃、酶解 pH 7.0、酶解时间 4 h 的条件下,对酶添加量之比(两种酶添加总量为 0.4%)、压力、给压时间这 3 个因素进行单因素试验及正交优化,测定酶解液氨基酸态氮和水解度值。

1.4 超高压辅助酶解条件的确定

1.4.1 单因素试验

在一定条件下,酶解完成后,样品置于 100℃ 沸水中灭酶 10 min,离心(8000×g, 20 min),取上清液备用。

1.4.1.1 酶添加量之比的确定

酶添加量之比(复合蛋白酶:风味蛋白酶)为 0:4、1:3、1:1、3:1、4:0,压力为 150 MPa,给压时间为 60 min。

1.4.1.2 压力的确定

酶添加量之比(复合蛋白酶:风味蛋白酶)为 3:1,压力为 100,150,200,250,300 MPa,给压时间为 60 min。

1.4.1.3 给压时间的确定

酶添加量之比(复合蛋白酶:风味蛋白酶)为 3:1,压力为 250 MPa,给压时间为 30,40,50,60,70 min。

1.4.2 正交试验

在单因素试验基础上,以酶添加量之比、压力、给压时间为影响因素进行 $L_9(3^3)$ 正交试验^[6],通过测定氨基酸态氮含量和水解度,选择最优水平组合,因素水平设计见表 1。

表 1 正交试验因素与水平

Table 1 The factors and levels of orthogonal experiment

水平	因素		
	A 酶添加量之比	B 压力(MPa)	C 加压时间(min)
1	1:1	150	40
2	3:1	200	50
3	4:0	250	60

1.5 试验方法

1.5.1 氨基酸态氮的测定

采用甲醛滴定法,参考王琳等^[7]的方法进行氨基酸态氮的测定。

1.5.2 水解度的测定

$DH(\%) = \text{水解液中氨基酸态氮含量} / \text{原料中总氮含量}$ (1)

式中:原料中总氮含量采用凯式定氮法测定^[8]。

1.5.3 感官评价

由 10 名经过培训小组成员(5 名男性,5 名女性;年龄在 23~25 岁)对不同压力、不同给压时间的酶解

液进行品评。首先,对他们在滋味、气味、色泽 3 个方面进行培训;其次,在 25 ℃ 下,小组成员单独接受随机 3 位数的样本和蒸馏水,以便在样品之间漱口。一组测试结束后,小组成员休息 5 min,然后对另外 5 个样本再次进行感官品评^[9-10],具体评分标准见表 2。

表 2 感官评价权重表

Table 2 The sensory evaluation weight table

项目及权重	评分标准	评分
滋味(40%)	没有腥苦味	17~20
	有淡淡的腥苦味	13~16
	能接受的腥苦味	9~12
	不太可以接受的腥苦味	5~8
	难以忍受的腥苦味	0~4
气味(30%)	有芳香味	25~30
	带点腥味,而且不影响整体感官	19~24
	带点腥味,但可以接受	13~18
	有腥味,勉强接受,对品质有影响	7~12
	有明显的腥味,完全不能接受	0~6
色泽(30%)	无涩味	25~30
	淡黄色偏亮	19~24
	淡黄色	13~18
	黄色	7~12
	黄色偏棕色	0~6

1.5.4 电子舌的测定

参照郑舒文等^[11]的方法改进得:将蓝蛤酶解液按体积比稀释 10 倍,过滤(0.45, 0.22 μm 的滤膜),取 80 mL 样液置于电子舌测试杯中,对其苦、鲜、苦和鲜味的回味进行测定,以基准液做空白对照。

1.5.5 电子鼻分析

电子鼻是模拟人体嗅觉,利用传感器对 10 类挥发性化合物进行鉴定识别的新型无损检测技术。传感器由 10 种金属氧化物半导体型化学传感元件组成^[12],每种传感元件对应的主要敏感物质见表 3。

表 3 化学传感器及其对应的敏感物质类型

Table 3 The chemical sensors and their corresponding sensitive substances' types

阵列序号	金属氧化物传感器名称	性能描述
MOS 1	W1C	芳香成分
MOS 2	W5S	灵敏度大,对氮氧化物很灵敏
MOS 3	W3C	氨水,对芳香成分灵敏
MOS 4	W6S	主要对氢气有选择性
MOS 5	W5S	烷烃芳香成分
MOS 6	W1S	对甲烷灵敏
MOS 7	W1W	对硫化物灵敏
MOS 8	W2S	对乙醇灵敏
MOS 9	W2W	芳香成分,对有机硫化物灵敏
MOS 10	W3S	对烷烃灵敏

样品处理:用 50 mL 的烧杯,称量 5 g 左右的待测样品,用保鲜膜封口,在室温下平衡 30 min。在 25 ℃ 环境中运用电子鼻传感器对样品进行检测。检测时间 120 s,进样流量和内部流量均为 600 L/min,数据采集时间为 85 s 和 90 s^[13]。

1.5.6 数据分析

每个处理进行 3 次重复,采用软件 SPSS 19.0 进行 ANOVA 分析和正交试验数据分析,并以 P<0.05 表示差异显著,采用 Origin 9.1 作图。

2 结果与分析

2.1 超高压酶解工艺的确定

2.1.1 酶添加量之比对酶解程度的影响

在压力 150 MPa、给压时间 60 min 的条件下,研究了不同酶添加量之比(复合蛋白酶:风味蛋白酶)对蓝蛤酶解液氨基酸态氮和水解度的影响,见图 1。




图 1 不同酶添加量之比对蓝蛤酶解液氨基酸态氮和水解度的影响

Fig. 1 The effect of different ratios of enzyme additive amount on amino acid nitrogen and hydrolysis degree of *Aloididae aloidii* hydrolysate

由图 1 可知,氨基酸态氮和水解度在不同酶添加量之和作用下呈上升趋势,且差异显著(P<0.05)。结合酶解液风味考虑,单酶(复合蛋白酶)酶解的酶解液味苦,腥味重,不能很好地改善酶解液的风味,故选取复合蛋白酶和风味蛋白酶为 3:1 的比例用于下一

步试验,并将(复合蛋白酶:风味蛋白酶)1:1、3:1、4:0 作为正交试验分析条件以确定最佳添加量。

2.1.2 压力对酶解程度的影响

在酶添加量(复合蛋白酶:风味蛋白酶)之比 3:1、给压时间 60 min 的条件下,研究了不同压力对蓝蛤酶解液氨基酸态氮和水解度的影响,见图 2。




图 2 不同压力对蓝蛤酶解液氨基酸态氮和水解度的影响

Fig. 2 The effect of different pressures on amino acid nitrogen and hydrolysis degree of *Aloididae aloidii* hydrolysate

由图 2 可知,氨基酸态氮和水解度在不同压力作用下呈先上升后下降的趋势,在 250 MPa 时出现最大值,且差异显著($P < 0.05$)。在 100~250 MPa 时,氨基酸态氮和水解度缓慢上升,在压力 > 250 MPa 时,氨基酸态氮和水解度直线下降,且氨基酸态氮和水解度低于常压酶解值。有可能是在一定压力下,酶三、四级结构发生变化,改变了酶切位点,提高了酶活性,使水解能力增强;当压力超过临界点时,酶结构被破坏,酶失活或变性,使水解能力降低^[14]。故选取 250 MPa 用于下一步试验,并将 150, 200, 250 MPa 作为正交试验分析条件以确定最佳压力。

2.1.3 给压时间对酶解程度的影响

在酶添加量之比(复合蛋白酶:风味蛋白酶)3:1、压力 150 MPa 的条件下,研究了不同给压时间对蓝蛤酶解液氨基酸态氮和水解度的影响,见图 3。




图 3 不同给压时间对蓝蛤酶解液氨基酸态氮和水解度的影响

Fig. 3 The effect of different time on amino acid nitrogen and hydrolysis degree of *Aloididae aloidii* hydrolysate

由图 3 可知,氨基酸态氮和水解度在不同给压时间作用下有相同趋势,在 50 min 时出现最高值,且差异显著($P < 0.05$)。说明在相同压力下,随着给压时间的延长,压力对酶作用越强,当给压时间超过 50 min 时,压力对酶有抑制现象。故选取 50 min 作为下一步酶解的最适条件。

2.1.4 超高压酶解工艺参数优化正交试验结果及条件验证

2.1.4.1 超高压酶解工艺参数优化正交试验结果

超高压酶解工艺参数优化的正交试验设计及结果见表 4。

表 4 正交试验设计及结果

Table 4 The orthogonal array design and results

组号	酶添加量之比	压力 (MPa)	给压时间 (min)	氨基酸态氮 (g/dL)	水解度 (%)
1	3	3	1	0.30	35.46
2	1	2	3	0.39	44.98
3	3	1	3	0.31	35.88
4	1	3	2	0.38	44.46
5	2	3	3	0.37	43.76
6	3	2	2	0.33	38.43
7	2	2	1	0.32	37.98

续 表

组号	酶添加量之比	压力 (MPa)	给压时间 (min)	氨基酸态氮 (g/dL)	水解度 (%)
8	2	1	2	0.32	37.05
9	1	1	1	0.33	38.43
氨基酸态氮	k ₁	0.37	0.32	0.32	
	k ₂	0.33	0.35	0.34	
	k ₃	0.31	0.35	0.36	
水解度	K ₁	42.62	37.12	37.29	
	K ₂	39.59	40.46	39.98	
	K ₃	36.59	41.23	41.54	
氨基酸态氮 R	0.05	0.03	0.04		
水解度 R	6.03	4.11	4.25		

由直观分析可知,影响因素的顺序为酶添加量之比>给压时间>压力,最优组合是 A₁C₃B₃。超高压酶解最优工艺条件为:酶添加量之比 1:1,压力 250 MPa,给压时间 60 min。正交试验的方差分析结果见表 5。

表 5 正交试验方差分析

Table 5 The variance analysis of orthogonal test

变异来源	自由度	SS		MS		F		P	
		氨基酸态氮	水解度	氨基酸态氮	水解度	氨基酸态氮	水解度	氨基酸态氮	水解度
酶添加量之比	2	4.00×10 ⁻³	54.55	2.00×10 ⁻³	27.28	32.28	31.11	0.03	0.03
压力	2	2.00×10 ⁻³	28.64	1.00×10 ⁻³	14.32	14.55	16.33	0.06	0.06
给压时间	2	2.00×10 ⁻³	27.77	1.00×10 ⁻³	13.88	18.14	15.84	0.05	0.06
误差	2	0.00	1.75	0.00	0.88				
总计	9	1.05	14228.74						

由表 5 可知,压力和给压时间对超高压酶解基本没影响,酶添加量之比对超高压酶解没有显著影响。

2.1.4.2 正交试验结果验证

因最优组在正交表中没有体现,故对正交试验结果进行验证。称取一定量的蓝蛤肉溶液,调节 pH 值至 7.0,按其重量的 0.2% 分别添加 1:1 的风味蛋白酶和复合蛋白酶,在压力 250 MPa 下给压 60 min 后置于 50 °C 水浴锅中酶解 4 h,在 100 °C 灭酶 10 min,离心(8000×g,20 min),取上清液备用。测得氨基酸态氮含量为 0.39 g/dL,水解度为 45.09%,高于正交试验中所有组分测得的氨基酸态氮值和水解度值,说明试验具有可靠性。故以常压酶解做对照组,以超高压处理做试验组,进行酶解液风味和蓝蛤蛋白结构变化的研究。

2.2 超高压酶解对酶解液风味的影响

2.2.1 感官评价分析

感官评价是人通过自身感觉对产品进行直观描述,量化地反映产品特性。超高压处理组和常压处理组的感官总评分及滋味、气味、色泽分值见表 6。

表 6 感官评价结果

Table 6 The sensory evaluation results

名称	滋味	色泽	气味	总分
常压	22.60±1.13	17.40±0.84	18.20±0.55	58.20±2.17
UP250	35.20±1.10	21.40±0.76	24.20±1.35	80.80±2.36

由表 6 可知,经过超高压处理酶解液的滋味、气味、色泽和总评分均高于常压处理组酶解液的感官评分;其中色泽相对差异最小,滋味差异最大,说明超高压酶解对改善风味效果显著。

2.2.2 电子鼻分析

根据样品顶空挥发物的数据处理和模式识别^[15],结果表示为主成分分析(PCA)和 LDA。

PCA 是将数据降维并进行线性分类,得到主要的二维散点图^[16]。常压和 UP250 处理酶解液 PCA 分析结果见图 4。




图 4 不同处理蓝蛤酶解液 PCA 分析结果

Fig. 4 PCA analysis results of *Aloididae aloidii* enzymatic hydrolysate by different treatments

图 4 中每个椭圆代表常压组和 UP250 处理组样液的数据采集点。经分析可知,PC1 和 PC2 的贡献率分别为 97.91% 和 1.16%,大于 85%,表明 PCA 结果分析能代表样品主要的信息特征。经过超高压处理,酶解液 PC1 和 PC2 都发生了变化。和常压处理组相比,UP250 组 PC1 变化较大,PC2 几乎无变化。说明 PCA 方法在数据分析中合适,电子鼻可以准确地区分两种酶解液。

LDA 是一种常规的模式识别和样品分类方法。LDA 主要是利用投影的原理将数据降维,会使组间数据分开,而组内数据聚集。LDA 方法注重的是挥发性成分的响应值在空间的分布状态以及彼此之间的距离分析^[17]。采用电子鼻分别检测常压与 UP250 处理的酶解液 LDA 结果,见图 5。




图 5 不同处理蓝蛤酶解液 LDA 分析结果

Fig. 5 LDA analysis results of *Aloididae aloidi* enzymatic hydrolysate by different treatments

由图 5 可知,线性判别函数 LD1 和 LD2 的贡献率分别为 98.60% 和 0.18%,区分度没有 PCA 的大,但是 LDA 图可在一定程度上表现出两种酶解液之间气味差异的远近程度。UP250 向上出现微小偏移,说明 UP250 酶解液中芳香成分差异较小,气味较为接近。

2.2.3 电子舌结果分析

电子舌通过模拟人的味觉识别系统,可以在量化感官数据的基础上评价体系的一致性。因而结合感官与电子舌的分析方法,更能真实地反映蓝蛤酶解液的滋味轮廓。超高压处理组与常压处理组的蓝蛤酶解液苦味、鲜味和其回味值见表 7。

表 7 苦味、鲜味及其回味结果

Table 7 The results of bitterness, umami and aftertaste

名称	苦味	回味	鲜味	丰富度
常压	17.01±0.00	5.08±0.00	12.63±0.00	2.42±0.00
UP250	12.50±0.22	0.90±0.30	13.64±0.04	2.60±0.13

由表 7 可知,经过超高压处理后,酶解液的苦味及其回味降低,鲜味及其回味增大,结果与感官评价结果一致,进一步证明超高压对改善水产品酶解液的风味有显著效果。

3 结论

通过正交试验确定了超高压酶解最佳工艺:酶添加量之比(复合蛋白酶:风味蛋白酶)3:1、压力 250 MPa、给压时间 60 min。利用感官评价、电子舌分析得出在压力 250 MPa,时间 60 min 条件时其滋味比常压处理的酶解液好;电子鼻分析可以很好地区分两种酶解液^[18]。超高压酶解可以改善酶解液的滋味,提高鲜味,降低苦腥味。超高压辅助酶解是制备优质海

鲜调味基料的一种新型技术。

参考文献:

- [1]周婷婷,郑荣泉,林志华,等.光滑河蓝蛤对净化养殖废水的净化效果[J].安徽农业科学,2017,45(32):57-60,64.
- [2]肖如武.蓝蛤蛋白源鲜味肽的制备及分离研究[D].广州:华南理工大学,2010:12-25.
- [3]耿瑞婷,王斌,马剑茵,等.扇贝蛋白酶解液脱腥脱苦工艺研究[J].中国调味品,2014,39(4):37-43.
- [4]Kaur B P, Kaushik N, Rao P S, et al. Effect of high-pressure processing on physical, biochemical and microbiological characteristics of black tiger shrimp (*Penaeus monodon*) [J]. Food and Bioprocess Technology, 2013(6):1390-1400.
- [5]Maria S D, Ferrari G, Maresca P. Effects of high hydrostatic pressure on the conformational structure and the functional properties of bovine serum albumin [J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2016, 33:67-75.
- [6]步营,胡显杰,刘波,等.香辣即食虾酱的研制开发[J].中国调味品,2018,43(8):72-75.
- [7]王琳,曹雁平,张单单,等.真空包装麻酱中腐败菌的分离鉴定及对麻酱品质的影响[J].中国食品学报,2017,17(6):187-194.
- [8]步营,胡显杰,刘瑛楠,等.两种浓缩方式对扇贝蒸煮液色泽及挥发性风味物质的影响[J].中国调味品,2019,44(12):12-17.
- [9]Vilma Kraujalyte, Pelvan E, Alasalvar C. Volatile compounds and sensory characteristics of various instant teas produced from black tea [J]. Food Chemistry, 2016, 194:864-872.
- [10]Pham A J, Schilling M W, Mikel W B, et al. Relationships between sensory descriptors, consumer acceptability and volatile flavor compounds of American dry-cured ham [J]. Meat Science, 2008, 80(3):728-737.
- [11]郑舒文,陈卫华.基于电子鼻和电子舌技术的鲑鱼鲜度评定[J].中国调味品,2019,44(5):164-169.
- [12]孙莹,彭子宁.电子鼻在调味料工业的应用研究进展[J].中国调味品,2018,43(7):170-172,177.
- [13]贺羽,王帅,姚俊胜,等.基于电子鼻和电子舌分析不同酿造阶段柠檬果醋气、味差异[J].中国调味品,2018,43(12):154-159.
- [14]李洪涛.基于农产品品质检测的专用电子鼻系统的设计与研究[D].杭州:浙江大学,2010.
- [15]李燕杰,梁钻好,蒋卓,等.黄油超高压增香工艺优化研究[J].食品研究与开发,2018,39(20):80-85.
- [16]周纷,张艳霞,张龙,等.冰鲜大黄鱼不同副产物中滋味成分差异分析[J].食品科学,2019,40(16):193-199.
- [17]高利萍,王俊,崔绍庆.不同成熟度草莓鲜榨果汁的电子鼻和电子舌检测[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2012,38(6):715-724.
- [18]孔繁东,李鑫,李江阔,等.电子鼻技术对不同处理海棠果贮藏后常温货架期的判别[J].食品工业,2016(4):108-112.